

# Chapitre 5 - Primitives et équations différentielles

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Primitives d'une fonction définie sur un intervalle à valeurs complexes</b>	<b>1</b>
2.1	Définitions . . . . .	1
2.2	Ensemble des primitives d'une fonction sur un intervalle . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Primitives des fonctions usuelles</b>	<b>3</b>
3.1	Tableau de primitives classiques . . . . .	3
3.2	Primitive d'un produit exponentielle - fonction trigonométrique . . . . .	3
3.3	Primitives de $\frac{1}{ax^2 + bx + c}$ . . . . .	4
<b>4</b>	<b>Existence de primitives</b>	<b>5</b>
4.1	Théorème fondamental de l'analyse . . . . .	5
4.2	Fonction de classe $\mathcal{C}^1$ . . . . .	6
<b>5</b>	<b>Techniques de calculs</b>	<b>7</b>
5.1	Formules de dérivations . . . . .	7
5.2	Intégration par parties . . . . .	8
5.3	Changement de variables . . . . .	9
<b>6</b>	<b>Equations différentielles linéaires</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Équations différentielles linéaires du premier ordre</b>	<b>11</b>
7.1	Définitions . . . . .	11
7.2	Résolution d'une équation homogène . . . . .	11
7.3	Principe de superposition . . . . .	12
7.4	Plan de résolution d'une équation différentielle . . . . .	13
7.5	Méthode de la variation de la constante . . . . .	14
7.6	Les EDL1 en sciences . . . . .	14
7.7	Problème de Cauchy . . . . .	15
<b>8</b>	<b>Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants</b>	<b>15</b>
8.1	Résolution des équations homogènes . . . . .	16
8.2	Solution particulière . . . . .	17
8.3	Résolution générale . . . . .	18
8.4	Problème de Cauchy . . . . .	19

## 1 Introduction

Ce chapitre est la première partie des deux chapitres sur l'intégration dans le programme de PTSI. Il se veut pratique et calculatoire, dans le but de résoudre des équations différentielles simples et de faire du calcul intégral.

Nous allons relier calcul de primitives et d'intégrales, travailler des techniques de calcul comme l'intégration par parties et le changement de variables.

Puis, nous résoudrons les équations différentielles linéaires du premier et second ordre.

Les équations différentielles apparaissent fréquemment en physique, car elles modélisent de nombreuses situations dans toutes les sciences.

Il s'agit d'un type d'équation dont les inconnues ne sont plus des nombres mais des fonctions.

REMARQUE 1 — Dans ce chapitre,  $I$  désignera un intervalle ouvert ( $I = ]\alpha, \beta[$ ).

Les résultats obtenus pourront s'étendre aux fonctions à valeurs dans  $\mathbb{C}$  ( $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ , fonctions à valeurs complexes), sauf si le contraire est précisé.

Pour une fonction définie sur un intervalle et à valeurs dans  $\mathbb{C}$ , la dérivabilité se définit comme ceci :

DÉFINITION 2

Soit  $I$  un intervalle. Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction telle que  $t \mapsto \Re(f(t))$  et  $t \mapsto \Im(f(t))$  sont dérivables sur  $I$ .

Alors  $f$  est dérivable sur  $I$ , et pour tout  $t \in I$  on a :

$$f'(t) = \Re(f(t))' + i\Im(f(t))'$$



### Application à la Physique

#### Électrocinétique

Dans un dipole  $RC$  en régime sinusoïdal dont un générateur impose aux bornes du dipole une tension  $e(t) = E \cos(\omega t + \phi)$ .

On obtient que la tension dans le système est donnée en fonction du temps par

$$u(t) = \frac{E e^{j\omega t}}{1 + jRC\omega} \quad \text{où } j = e^{i\pi/2}.$$

**Remarque :** En physique on utilise la lettre  $j$  pour le nombre complexe  $i$ , qui s'écrit aussi  $e^{i\pi/2}$ .

## 2 Primitives d'une fonction définie sur un intervalle à valeurs complexes

### 2.1 Définitions

DÉFINITION 3 (Primitive)

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction.

On appelle **primitive de  $f$**  une fonction  $F : I \rightarrow \mathbb{C}$  dérivable, telle que  $F' = f$ .



### Risque d'erreur

Une primitive n'est pas unique, on ne parlera donc pas de **la** primitive mais **d'une** primitive.

En effet, les fonctions constantes  $x \mapsto 1$  et  $x \mapsto 3$  sont deux primitives distinctes de la fonction nulle  $x \mapsto 0$ .

EXEMPLE 4 —

- La fonction  $x \mapsto \cos(x) - x$  est une primitive de  $x \mapsto -\sin(x) - 1$ .
- Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $x \mapsto \frac{x^n}{n!}$  est une primitive de  $x \mapsto \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$ .
- $x \mapsto -ie^{ix}$  est une primitive de  $x \mapsto e^{ix}$ .

## 2.2 Ensemble des primitives d'une fonction sur un intervalle

Lorsque une primitive existe on sait qu'elle n'est pas unique.

On décrit ici l'ensemble des primitives d'une fonction  $f$ , dans le cas où  $f$  admet une primitive.

PROPOSITION 5

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$  qui admet primitive  $F_0 : I \rightarrow \mathbb{C}$ .

Alors, les primitives de  $f$  sur  $I$  sont toutes de la forme  $x \mapsto F_0(x) + k$ , avec  $k \in \mathbb{C}$ .

Si la fonction  $f$  est à valeurs réelles, les primitives (à valeurs réelles) sont définies à une constante réelle près.

EXEMPLE 6 — L'ensemble des primitives réelles de  $f : x \mapsto x^3 - 1$  est

$$\left\{ x \mapsto \frac{x^4}{4} - x + k \mid k \in \mathbb{R} \right\}.$$

### 3 Primitives des fonctions usuelles

#### 3.1 Tableau de primitives classiques

Le tableau suivant est réciproque à celui des dérivées. Il permet de calculer directement un grand nombre d'intégrales.

Fonction $f$	Primitive $F$	Intervalle $I$
$x \mapsto a$ (constante non nulle)	$x \mapsto ax$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto x^n (n \geq 1)$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{x^n} (n > 1)$	$x \mapsto -\frac{1}{(n-1)x^{n-1}}$	$] -\infty; 0[$ ou $0; +\infty[$
$x \mapsto x^\alpha (\alpha \neq -1)$	$x \mapsto \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$\mathbb{R}_+^*$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	$x \mapsto 2\sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+^*$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$\ln x$	$\mathbb{R}_+^*$
$x \mapsto e^x$	$x \mapsto e^x$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto ch(x)$	$x \mapsto sh(x)$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto sh(x)$	$x \mapsto ch(x)$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \sin(x)$	$x \mapsto -\cos(x)$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \cos(x)$	$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$	$x \mapsto \arctan(x)$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \mapsto \arcsin(x)$	$] -1; 1[$
$x \mapsto \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \mapsto \arccos(x)$	$] -1; 1[$
$x \mapsto \ln(x)$	$x \mapsto x \ln(x) - x$	$\mathbb{R}_+^*$
$x \mapsto \tan(x)$	$x \mapsto -\ln( \cos(x) )$	$] -\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi[, k \in \mathbb{Z}$

#### 3.2 Primitive d'un produit exponentielle - fonction trigonométrique

## PROPOSITION 7

Soit  $\lambda \in \mathbb{C}^*$ .

Alors,  $x \mapsto \frac{e^{\lambda x}}{\lambda}$  est une primitive de  $x \mapsto e^{\lambda x}$ . (Cf. Chapitre sur les complexes)

## PROPOSITION 8

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ , une fonction admettant une primitive  $F : I \rightarrow \mathbb{C}$ .

Alors  $\Re(F)$  et  $\Im(F)$  sont des primitives de  $\Re(f)$  et  $\Im(f)$ .

On peut appliquer le résultat précédent pour rechercher des primitives de fonctions réelles :

MÉTHODE 9 (Déterminer une primitive de  $x \mapsto e^{ax} \cos(bx)$  ou  $x \mapsto e^{ax} \sin(bx)$ )

1. On pose  $\lambda = a + ib$  et  $f(x) = e^{\lambda x} = e^{ax} \cos(bx) + ie^{ax} \sin(bx)$ .
2. On sait que  $F : x \mapsto \frac{e^{\lambda x}}{\lambda}$  est une primitive de  $f$ .
3. On calcule la partie réelle et imaginaire de  $F$ , et on obtient ainsi une primitive pour  $x \mapsto e^{ax} \cos(bx)$  et  $x \mapsto e^{ax} \sin(bx)$ .

EXEMPLE 10 —  $x \mapsto e^x \times \left( \frac{\cos(x) - \sin(x)}{2} \right)$  est une primitive de  $x \mapsto e^x \cos(x)$ .

EXERCICE 1 — Déterminer une primitive de  $x \mapsto e^{2x} \cos(3x)$  et de  $x \mapsto e^{2x} \sin(3x)$ .

### 3.3 Primitives de $\frac{1}{ax^2 + bx + c}$

On détermine les primitives des fonctions de la forme  $x \mapsto \frac{1}{ax^2 + bx + c}$ , pour  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . Cela nécessite plusieurs cas.

On distingue d'abord par un cas plus simple (le cas  $a = 0$ ).

Pour  $b \neq 0$ , on sait calculer les primitives des fonctions de la forme  $x \mapsto \frac{1}{bx + c}$  à l'aide de la fonction logarithme.

## PROPOSITION 11

Soient  $b, c \in \mathbb{R}$ ,  $b \neq 0$ , et

$$f : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{-c}{b} \right\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \frac{1}{bx + c} .$$

Alors, une primitive de  $f$  est  $F(x) = \frac{\ln(|bx + c|)}{b}$ .

**Démonstration** — Sur feuille. On dérive  $F$ .

## PROPOSITION 12

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  avec  $a \neq 0$ , et

$$f : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{-b}{a} \right\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \frac{1}{(ax + b)^2} .$$

Alors une primitive de  $f$  est  $F(x) = \frac{-1}{a} \times \frac{1}{ax + b}$ .

**Démonstration** — On dérive  $F$  pour vérifier que  $F' = f$ .

## PROPOSITION 13

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \text{Soient } a, b \in \mathbb{R} \text{ avec } a \neq 0, \text{ et} \quad x &\longmapsto \frac{1}{(ax+b)^2+1}. \end{aligned}$$

Alors une primitive de  $f$  est  $F : x \mapsto \frac{1}{a} \times \arctan(ax+b)$ . **Démonstration** — On dérive  $F$ .

Avec les primitives précédentes, on peut obtenir une primitive de toutes les fonctions de la forme  $\frac{1}{ax^2+bx+c}$ . Cela est indiqué dans la méthode suivante :

#### MÉTHODE 14

Soient  $a \neq 0$  et  $b, c \in \mathbb{R}$  et  $f : x \mapsto \frac{1}{ax^2+bx+c}$ .

En fonction du signe du discriminant de  $ax^2+bx+c$ , il y a 3 cas différents de primitives.

1. Si  $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ , on a  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  tels que  $ax^2+bx+c = a(x-x_1)(x-x_2)$ .

(a) Alors, il existe  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  tels que  $f(x) = \frac{1}{a} \times \left[ \frac{\alpha}{x-x_1} + \frac{\beta}{x-x_2} \right]$ .

On développe l'expression de droite pour trouver les valeurs de  $\alpha$  et  $\beta$ .

(b) Une primitive de  $f$  est alors :

$$\frac{\alpha}{a} \times \ln(|x-x_1|) + \frac{\beta}{a} \times \ln(|x-x_2|)$$

2. Si  $\Delta = 0$ , alors il existe  $x_0 \in \mathbb{R}$  tel que  $f(x) = a(x-x_0)^2$ .

Une primitive de  $f$  est alors :

$$F(x) = \frac{-1}{a} \times \frac{1}{x-x_0}.$$

3. Si  $\Delta < 0$ , alors il existe  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$  tels que  $ax^2+bx+c = \alpha((\beta x + \gamma)^2 + 1)$ .

On développe l'expression de droite pour trouver les valeurs  $\alpha, \beta, \gamma$ .

Une primitive de  $f$  est alors :

$$F(x) = \frac{1}{\alpha\beta} \times \arctan(\beta x + \gamma).$$

EXERCICE 2 — Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

1.  $f_1 : x \mapsto \frac{1}{x^2-3x+2}$

2.  $f_2 : x \mapsto \frac{1}{x^2-4x+4}$

3.  $f_3 : x \mapsto \frac{1}{x^2+x+1}$

## 4 Existence de primitives

Venons-en au théorème central sur les primitives.

### 4.1 Théorème fondamental de l'analyse

THÉORÈME 15 (Théorème fondamental de l'analyse)

Soit  $I$  un intervalle. Soit  $f$  une fonction continue sur  $I$ , et  $a \in I$ .

Alors, la fonction  $F : x \in I \mapsto \int_a^x f(t)dt \in \mathbb{R}$  est dérivable sur  $I$ , et sa dérivée est la fonction  $f$  ( $F' = f$ ).

Autrement dit, la fonction  $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$  est une primitive de  $f$ .

**Démonstration** — *Admis. (Pour l'instant)*

Pour une fonction  $f$  à valeurs complexes, on applique le théorème précédent à  $Re(f)$  et à  $Im(f)$ .

En effet, avec les propriétés de l'intégrale (linéarité de l'intégrale), on a :

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^b Re(f(t))dt + \int_a^b Im(f(t))dt$$

**REMARQUE 16** — *La primitive  $F : x \in I \mapsto \int_a^x f(t)dt$  donnée dans le théorème fondamental est l'unique primitive de  $f$  qui s'annule en  $a$  ( $F(a) = 0$ ).*

**NOTATION 17**

*Pour  $f$  une fonction continue, la notation  $\int_a^x f(t)dt$  désigne une primitive générique de  $f$ .*

On en déduit ainsi l'outil fondamental du calcul intégral, que vous avez déjà rencontré en classe de terminale.

**THÉORÈME 18 (Théorème de Newton-Leibniz)**

*Soit  $I$  un intervalle. Soit  $f$  une fonction continue sur  $I$ , et  $F$  une primitive de  $f$  sur  $I$ . Alors, pour tous  $a, b \in I$  on a :*

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a).$$

**DÉFINITION 19**

*On note  $[F(t)]_a^b = F(b) - F(a)$ .*

**EXEMPLE 20** — *On sait que  $f : x \mapsto \cos(x) - x$  est continue sur  $[0, \pi]$  et admet pour primitive*

$$F : x \mapsto \sin(x) - \frac{x^2}{2}.$$

*D'après le théorème de Newton-Leibniz, on a alors :*

$$\int_0^\pi f(t)dt = [F(t)]_0^\pi = (\sin(\pi) - \frac{\pi^2}{2}) - (\sin(0) - \frac{0^2}{2}) = -\frac{\pi^2}{2}.$$

Le théorème de Newton-Leibniz indique que déterminer une primitive et calculer une intégrale sont les deux faces d'une même pièce. Si l'on connaît la valeur des intégrales, alors on connaît la primitive. Et si l'on connaît la primitive, alors on connaît la valeur des intégrales.

Lorsque l'on vous demande de calculer une intégrale, l'une des méthodes pour y arriver est de chercher une primitive de la fonction à intégrer.

Cependant, il n'est pas toujours possible de déterminer une primitive d'une fonction  $f$  donnée. (Ex : Il est impossible d'exprimer une primitive de  $x \mapsto \exp(x^2)$  uniquement à l'aide des fonctions usuelles (comme un produit, somme, composée, quotient de fonctions usuelles).

## 4.2 Fonction de classe $\mathcal{C}^1$

Dans le théorème fondamental de l'analyse, on a considéré une primitive  $F$  d'une fonction  $f$  continue. La fonction  $F$  est une fonction dérivable dont la dérivée est continue.

Ce type de fonction est très utile en analyse. Ce sont les fonctions de "classe  $\mathcal{C}^1$ ".

**DÉFINITION 21 (Fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$ )**

*Soient  $I$  un intervalle et  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ .*

*On dit que  $f$  est de **classe  $\mathcal{C}^1$**  sur  $I$  si elle est dérivable sur  $I$  et si sa dérivée  $f'$  est continue sur  $I$ .*

*On note  $\mathcal{C}^1(I)$  l'ensemble des fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$*

EXEMPLE 22 — Soit  $I = ]-1, 1[$ .

1. La fonction  $f : x \mapsto x^2 + x + 1$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ .
2. Par contre, la fonction  $g : x \mapsto \begin{cases} x \sin(\frac{1}{x}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$  est continue, mais n'est pas de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ .  
Elle est par contre de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $]0, 1[$ .

PROPOSITION 23

Soient  $I$  un intervalle et  $f, g \in \mathcal{C}^1(I)$ . Alors :

- La somme  $f + g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ .
- Le produit  $f \times g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ .
- Pour tous  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ,  $\lambda.f + \mu.g$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ .
- Si  $g$  ne s'annule pas sur  $I$ , le quotient  $\frac{f}{g}$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ .
- Pour  $h : J \rightarrow I$  de classe  $\mathcal{C}^1$ , la composée  $f \circ h$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ .

**Démonstration** — On utilise les formules de dérivation d'une somme, produit, quotient, composée, et les propriétés des fonctions continues.

THÉORÈME 24 (Linéarité de l'intégrale)

Soient  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  et  $f, g$  des fonctions continues sur  $I$ . Alors, pour tous  $a, b \in I$  on a :

$$\int_a^b \lambda.f(t) + \mu.g(t)dt = \lambda. \int_a^b f(t)dt + \mu. \int_a^b g(t)dt$$

**Démonstration** — On utilise le théorème de Newton-Leibniz, et les propriétés de la dérivée de sommes/multiples.

Grâce au théorème de Newton-Leibniz, on relie sans soucis dérivée et intégration :

PROPOSITION 25

Soit  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ . Alors, pour tous  $a, b \in I$  on a :

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t)dt.$$

**Démonstration** — Sur feuille.

EXERCICE 3 — Montrer que  $F : x \mapsto \frac{\text{Arctan}(x)}{x^2 + 1}$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ .  
Calculer sa dérivée.

## 5 Techniques de calculs

### 5.1 Formules de dérivations

Pour pouvoir facilement reconnaître une primitive d'une fonction  $f$  que l'on souhaite intégrer, on peut utiliser les formules suivantes de dérivations :

$$\frac{u'}{\sqrt{u}} = (2\sqrt{u})' \quad \frac{u'}{u^2} = \left(-\frac{1}{u}\right)'$$

$$2u'u = (u^2)' \quad u'u^n = \left(\frac{1}{n+1}u^{n+1}\right)' \quad u'u^\alpha = \left(\frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1}\right)' \quad (\alpha \neq -1)$$



$$\frac{u'}{u} = (\ln |u|)' \quad u'e^u = (e^u)'$$

EXERCICE 4 — Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}_+^*$  par  $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$ .  
Déterminer une primitive de  $f$ .

## 5.2 Intégration par parties

Une deuxième méthode pour s'aider à calculer des intégrales est l'intégration par parties. Cela permet de transformer l'intégrale, en utilisant la formule  $(uv)' = u'v + uv'$ .

THÉORÈME 26 (IPP)

Soient  $I$  un intervalle et  $u, v \in C^1$  de classe  $C^1$ .

Alors, pour tous réels  $a, b \in I$ , on a :

$$\int_a^b u(t)v'(t)dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t)dt$$

Démonstration — Sur feuille.

EXEMPLE 27 — Déterminons à l'aide d'une intégration par partie la valeur de  $\int_1^e \ln(t)dt$ .

On pose pour cela  $u(t) = \ln(t)$  et  $v'(t) = 1$ , on a donc pour tout  $t \in [1, e]$ ,  $u'(t) = \frac{1}{t}$ , et une primitive de  $v'$  est donnée par  $v(t) = t$ .

Les fonction  $u$  et  $v$  sont bien de classe  $C^1$  sur  $[1, e]$ .

D'après la formule d'intégration par parties on obtient :

$$\int_1^e \ln(t)dt = [t \ln(t)]_1^e - \int_1^e t \times \frac{1}{t} dt = e - \int_1^e 1 dt = e - (e - 1) = 1.$$

MÉTHODE 28

Pour calculer une intégrale par intégration par parties (IPP) :

1. On détermine les fonctions  $u$  et  $v$  qui interviennent et on vérifie qu'elles sont de classe  $C^1$  sur l'intervalle considéré.
2. On calcule l'intégrale  $\int_a^b u'(t)v(t)dt$ , qui doit être plus facile à calculer que l'intégrale initiale.  
Si ce n'est pas le cas, alors l'intégration par parties que l'on a faite n'aide pas.
3. On applique la formule d'intégration par parties.

EXERCICE 5 — Calculer les intégrales suivantes à l'aide d'une intégration par parties :

$$1. \int_0^1 te^t dt. \quad 2. \int_1^e \ln(x) dx.$$

EXERCICE 6 — Déterminer, à l'aide d'une intégration par parties, une primitive de  $\arctan$ .

### 5.3 Changement de variables

Une autre technique pour calculer des primitives/intégrales est le changement de variables. Cela se base sur la formule  $(u \circ v)' = v' \cdot u' \circ v$ .

#### THÉORÈME 29

Soient  $f$  une fonction continue sur  $[a; b]$ , et  $u$  une fonction  $\mathcal{C}^1$  sur  $[\alpha; \beta]$ , telle que  $u([\alpha; \beta]) \subset [a; b]$ . Alors, on a :

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(u(t))u'(t)dt = \int_{u(\alpha)}^{u(\beta)} f(x)dx$$

#### Démonstration :

Effectuer un changement de variables sur l'intégrale  $\int_a^b f(t)dt$  consiste à remplacer la variable  $t$  par une nouvelle variable  $u$ .

La première intégrale est alors égale à une deuxième intégrale.

Et, si la variable  $u$  est bien choisie, la deuxième intégrale est plus simple à calculer.

Cette variable  $u$  s'exprime en fonction de  $t$  (ex :  $u = \cos(t)$ ,  $u = t^2$ ,  $u = \exp(t)$ ).

Dans l'intégrale, il faut ensuite remplacer les 3 éléments qui dépendent de  $t$  :

1. Les bornes  $a, b$ .
2. La fonction intégrée  $f(t)$ .
3. La variable d'intégration  $dt$ .

Voyons cela sur des exemples.

EXEMPLE 30 — Calculer  $\int_1^2 \ln(t)^2 dt$ .

1. On pose  $u = \ln(t)$ .  
La fonction  $\ln$  est bien définie sur  $[1, 2]$ , dérivable, de dérivée continue. Elle est bien de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[1, 2]$ .
2. On a  $u = \ln(t) \Leftrightarrow t = \exp(u)$ .  
En différenciant, on obtient :  $du = \frac{1}{t} dt$  et  $dt = \exp(u) du$ .
3. Quand  $t = 1$  on a  $u = \ln(1) = 0$ , et quand  $t = 2$  on a  $u = \ln(2)$ .
4. On a  $\ln(t)^2 = u^2$ .
5. On obtient donc, par changement de variables :  $\int_1^2 \ln(t)^2 dt = \int_0^{\ln(2)} u^2 \exp(u) du$ .
6. Une primitive de la fonction  $u \mapsto u^2 \exp(u)$  est  $u \mapsto \exp(u)(u^2 - \frac{1}{2}u + \frac{1}{2})$ .  
Ainsi, on a  $\int_1^2 \ln(t)^2 dt = \int_0^{\ln(2)} u^2 \exp(u) du = [\exp(u)(u^2 - \frac{1}{2}u + \frac{1}{2})]_0^{\ln(2)} = 2(\ln(2))^2 - \frac{\ln(2)}{2} + \frac{1}{2} - 1 \cdot (0 - 0 + \frac{1}{2})$ .

EXEMPLE 31 — Pour calculer  $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-t^2} dt$  :

- On peut poser le changement de variables  $t = \sin(u)$ .  
En effet, on a  $\sin$  de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, \frac{\pi}{6}]$  et  $\sin([0, \frac{\pi}{6}]) = [0, \frac{1}{2}]$  et  $dt = \cos(u) du$ .

- Par la formule de changement de variables, on obtient que :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-t^2} dt = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{1-\sin(u)^2} \cos(u) du = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos(u)^2 du$$

- En linéarisant  $\cos^2(u)$ , on obtient  $\cos^2(u) = \frac{1 + \cos(2u)}{2}$ , dont une primitive est  $u \mapsto \frac{u}{2} + \frac{\sin(2u)}{4}$ .

- On obtient la valeur de l'intégrale initiale :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-t^2} dt = \left[ \frac{2u + \sin(2u)}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{12} + \frac{1}{4}.$$

### MÉTHODE 32

Soit  $I = \int_a^b f(t)dt$ . Pour effectuer un changement de variables :

- On pose  $x = u(t)$  où  $u$  est une fonction de classe  $C^1$  sur  $[a; b]$ .  
Cela donne  $dx = u'(t)dt$ , ainsi que  $t = u^{-1}(x)$  et  $dt = (u^{-1})'(x)dx$ .
- On utilise ces relations pour remplacer  $f(t)$  et  $dt$  dans l'intégrale par des termes en  $x$  et  $dx$ .
- Enfin, on s'occupe des bornes. Quand  $t = a$  on a  $x = u(a)$ , et quand  $t = b$  on a  $x = u(b)$ .

On a alors  $\int_a^b f(t)dt = \int_{u(a)}^{u(b)} g(x)dx$ .

L'objectif est que cette seconde intégrale soit a priori plus simple à calculer.

Si ce n'est pas le cas, alors le changement de variables choisi n'aide pas.

EXERCICE 7 — Calculer  $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}} dt$  en effectuant le changement de variables  $x = 1 + e^t$ .

## 6 Equations différentielles linéaires

Maintenant que nous avons des outils pour le calcul de primitives et d'intégrales, nous allons étudier les équations différentielles linéaires d'ordre 1 et 2. Commençons par définir cela.

### DÉFINITION 33

Soit  $I$  un intervalle. Soient  $a, b, c : I \rightarrow \mathbb{R}$  des fonctions continues.

Une équation différentielle (sur  $I$ ) est une équation où l'inconnue est une fonction  $y$ .

Cette fonction  $y$  peut être à valeurs réelles ( $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ ) ou parfois à valeurs complexes ( $y : I \rightarrow \mathbb{C}$ ).

Les familles d'équations différentielles que nous étudierons sont :

- $y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$ , **équation différentielle linéaire d'ordre 1 (EDL1)**;
- $y'(x) + a(x)y(x) = 0$ , **équation différentielle linéaire d'ordre 1 homogène (EDL1 homogène)**;
- $y''(x) + a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x)$ , **équation différentielle linéaire d'ordre 2 (EDL2)**;
- $y''(x) + a(x)y'(x) + b(x)y(x) = 0$ , **équation différentielle linéaire d'ordre 2 homogène (EDL2 homogène)**.

Dans certains cas, les fonctions  $a$  (ou  $a, b$ ) seront constantes. On parle alors d'équations à **coefficients constants**.

Une EDL **homogène** est une équation différentielle dont le terme de droite vaut 0.

### EXEMPLE 34 —

- $y'(x) + 2xy(x) = 0$  est une EDL1 homogène (sur  $I = \mathbb{R}$ ).  
La fonction  $x \mapsto e^{-x^2}$  est une solution.
- $y'(x) + \frac{1}{x}y(x) = 3$  est une EDL1 (sur  $I = ]0, +\infty[$  ou sur  $] -\infty, 0[$ ).
- $y'(x) - 2y(x) = x$  est une EDL1, à coefficients constants (sur  $I = \mathbb{R}$ ).  
La fonction  $x \mapsto \frac{-2x-1}{4}$  est une solution.
- $y''(x) + y(x) = 0$  est une EDL2 homogène, à coefficients constants (sur  $I = \mathbb{R}$ ).  
Les fonctions  $\cos$  et  $\sin$  sont des solutions.
- $y''(x) - e^x y'(x) + 3 \cos(x)y(x) = \ln(x)$  est une EDL2 (sur  $I = ]0, +\infty[$ ).
- $y''(x) - 2y'(x) + 3y(x) = \ln(x)$  est une EDL2, à coefficients constants (sur  $I = ]0, +\infty[$ ).

REMARQUE 35 — *Les solutions d'une EDL1 doivent être des fonctions dérivables. (il faut que  $y'$  existe)*

*Les solutions d'une EDL2 doivent être des fonctions deux fois dérivables. (il faut que  $y', y''$  existent).*

Pour certaines équations différentielles, il est possible de trouver avec quelques calculs une solution. Par exemple, la fonction nulle ( $x \mapsto 0$ ) est toujours une solution des EDL homogènes. L'objectif de ce chapitre est de résoudre des EDL, c'est-à-dire trouver **toutes** leurs solutions. Nous étudierons de même certaines propriétés des équations différentielles et de leurs ensembles de solutions.

## 7 Équations différentielles linéaires du premier ordre

### 7.1 Définitions

PROPOSITION 36

*Soit  $I$  un intervalle.*

*L'ensemble des solutions de l'équation différentielle  $(\mathcal{E}) : y'(x) = 0$  sur  $I$  est  $S = \{x \in I \mapsto C, C \in \mathbb{R}\}$ .*

*Autrement dit, pour  $y$  une fonction dérivable, sa dérivée  $y'$  est la fonction si et seulement si  $y$  est une fonction constante.*

Ce résultat, que nous avons en fait déjà vu avec les propriétés des intégrales, est le premier élément qui permet de résoudre des EDL.

EXEMPLE 37 — *L'équation  $(\mathcal{E}) : y' - y = x$  est une équation différentielle linéaire du premier ordre (EDL1). Sur  $I = \mathbb{R}$ , ses solutions sont exactement les fonctions de la forme  $x \mapsto k.e^x - x - 1$ , pour  $k \in \mathbb{R}$ .*

DÉFINITION 38 (**Equation homogène associée**)

*Soit  $(\mathcal{E}) : y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$  une équation différentielle linéaire du premier ordre.*

*On appelle **équation homogène associée** à  $(\mathcal{E})$  l'EDL1  $(\mathcal{E}_h) : y'(x) + a(x)y(x) = 0$ .*

### 7.2 Résolution d'une équation homogène

Une équation différentielle homogène admet toujours la fonction nulle comme solution. On s'intéresse ici à déterminer l'ensemble de toutes les solutions d'une équation différentielle homogène.

Nous allons nous servir de la fonction exponentielle et des primitives pour décrire la forme des solutions en général.

EXEMPLE 39 — *(Résolution des EDL1 homogènes à coefficients constants) Pour aborder la résolution générale des EDL1 homogènes, traitons d'abord le cas particulier à coefficients constants.*

*C'est-à-dire lorsque l'équation est de la forme  $(\mathcal{E}) : y'(x) + ay(x) = 0$ , pour un  $a \in \mathbb{R}$ .*

*Nous allons raisonner en deux temps.*

*On remarque d'abord que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $(e^{-ax})' = -ae^{-ax}$ .*

*On obtient  $(e^{-ax})' + a.e^{-ax} = -ae^{-ax} + a.e^{-ax} = 0$ , donc  $x \mapsto e^{-ax}$  est solution de l'équation  $(\mathcal{E})$ .*

*Soit maintenant,  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une solution de l'équation différentielle  $(\mathcal{E})$ .*

*On pose  $y : x \in \mathbb{R} \mapsto f(x)e^{ax}$ , définie sur  $\mathbb{R}$  et dérivable comme produit de fonctions dérivables. Alors, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on obtient :*

$$y'(x) = f'(x).e^{ax} + f(x).(ae^{ax}) = -a.f(x)e^{ax} + a.f(x)e^{ax} = 0.$$

D'après une Proposition précédente, on en déduit que  $y$  est constante sur  $\mathbb{R}$ .  
Ainsi, il existe un  $k \in \mathbb{R}$  tel que  $f : x \mapsto k.e^{-ax}$ .

Conclusion : L'ensemble des solutions de l'équation  $(\mathcal{E})$  est  $\mathcal{S} = \{x \mapsto k.e^{-ax} \mid k \in \mathbb{R}\}$ .

#### THÉORÈME 40 (Solutions d'une EDL1 homogène)

Soit  $I$  un intervalle. Soit  $(\mathcal{E}_0) : y'(x) + a(x)y(x) = 0$  une EDL1 homogène sur  $I$ . Alors :

1. Il existe  $f_0$  une solution de  $(\mathcal{E}_0)$  qui n'est pas la fonction nulle.
2. La fonction  $f_0$  ne s'annule pas sur  $I$ . ( $\forall x \in I, f_0(x) \neq 0$ )
3. L'ensemble des solutions de  $(\mathcal{E}_0)$  est

$$\mathcal{S}_0 = \{\lambda.f_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

4. Soit  $A : I \rightarrow \mathbb{R}$  une primitive de la fonction  $a$ .

Alors, la fonction  $x \mapsto \exp(-A(x))$  est une solution de  $(\mathcal{E}_0)$ , qui ne s'annule pas.

**Démonstration** — Sur feuille.

#### MÉTHODE 41 (Résoudre une EDL1 homogène)

Soit  $(\mathcal{E}_0) : y'(x) + a(x)y(x) = 0$  une EDL1 homogène, sur un intervalle  $I$ . Résolvons-la.

1. On détermine  $A : I \rightarrow \mathbb{R}$  une primitive de  $a$ .
2. On pose  $f_0 : x \mapsto e^{-A(x)}$ .
3. L'ensemble des solutions  $\mathcal{S}_0$  de  $(\mathcal{E}_0)$  est  $\mathcal{S}_0 = \{\lambda.f_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$ .

#### EXERCICE 8 — Résoudre les équations différentielles suivantes.

On précisera l'ensemble de définition de  $a$ , et l'intervalle sur lequel on résout l'EDL.

1.  $y' + \cos(x)y = 0$
2.  $y' - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}y = 0$
3.  $y' + \frac{\ln(x)}{x}.y = 0$

Maintenant que l'on sait résoudre les EDL1 homogènes, résolvons les EDL1. Pour cela, nous avons besoin de deux outils en plus.

### 7.3 Principe de superposition

#### THÉORÈME 42 (Principe de superposition)

Soit  $I$  un intervalle. Soient  $a, b_1, b_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$  des fonctions continues. On pose  $(E_1) : y' + a(x)y = b_1(x)$  et  $(E_2) : y' + a(x)y = b_2(x)$  des EDL1.

Soient  $f_1, f_2$  des solutions de  $(E_1)$  et  $(E_2)$ .

Alors,  $f_1 + f_2$  est une solution de l'EDL1  $(E_1 + E_2) : y' + a(x)y = b_1(x) + b_2(x)$ .

**Démonstration** — On vérifie que  $f_1 + f_2$  est une solution de l'EDL1.

#### MÉTHODE 43

Quand la fonction  $b$  dans le **second membre** (le terme de droite) est compliquée, on la décompose en une somme de fonctions plus simples :  $b = b_1 + \dots + b_n$ .

Ensuite, pour chaque  $i \in \{1, \dots, n\}$ , on trouve  $f_i$  une solution à l'EDL1 dont le second membre est  $b_i$ .

Enfin, d'après le principe de superposition, la fonction  $f = f_1 + \dots + f_n$  est une solution de l'EDL1  $y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$ .

EXEMPLE 44 — Pour trouver une solution à  $(E) : y'(x) + y(x) = x + \cos(x) + e^{2x}$ , on cherche une solution à  $(E_1) : y'(x) + y(x) = x$ ,  $(E_2) : y'(x) + y(x) = \cos(x)$ , et  $(E_3) : y'(x) + y(x) = e^{2x}$ . En tâtonnant on trouve que  $f_1(x) = x - 1$ ,  $f_2(x) = \frac{\cos(x) + \sin(x)}{2}$  et  $f_3(x) = \frac{1}{3}e^{2x}$  sont des solutions de  $(E_1)$ ,  $(E_2)$ ,  $(E_3)$ .  
Donc,  $f(x) = x - 1 + \frac{\cos(x) + \sin(x)}{2} + \frac{1}{3}e^{2x}$  est une solution de  $(E)$ .

REMARQUE 45 — Fait important : Nous allons utiliser le principe de superposition avec  $f = f + 0$ .

EXEMPLE 46 — Soit  $(E) : y'(x) + y(x) = x$ . C'est une EDL1 sur  $I = \mathbb{R}$ .

Son équation homogène associée est  $(E_0) : y'(x) + y(x) = 0$ .

Or, on connaît toutes les solutions de  $(E_0)$  : ce sont les fonctions de la forme  $x \mapsto ke^{-x}$ , avec  $k \in \mathbb{R}$ .

On a aussi vu que  $f_0(x) = x - 1$  est une solution de  $(E)$ .

D'après le principe de superposition, on en déduit que toutes les fonctions de la forme  $x \mapsto ke^{-x} + x - 1$ ,  $k \in \mathbb{R}$ , sont des solutions de  $(E)$ .

## 7.4 Plan de résolution d'une équation différentielle

Pour résoudre une EDL1 nous allons utiliser le *principe de superposition* : une solution de l'EDL1 s'écrit comme la somme d'une solution de l'EDL1 homogène associée et d'une solution particulière de l'équation.

### THÉORÈME 47

Soit  $(\mathcal{E}) : y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$  une EDL1 sur un intervalle  $I$ .

Notons  $(E_0) : y'(x) + a(x)y(x) = 0$  son équation homogène associée, et  $\mathcal{S}_0$  l'ensemble des solutions de  $(E_0)$ .

1. L'équation  $(\mathcal{E})$  possède au moins une solution  $f_p$ .
2. L'ensemble des solutions de l'EDL  $(\mathcal{E})$  est  $\mathcal{S} = \{f_p + f, f \in \mathcal{S}_0\}$ .  
Les solutions de l'EDL  $(\mathcal{E})$  sont toutes les fonctions qui s'écrivent comme la somme d'une solution  $f_p$  de  $(\mathcal{E})$  et d'une solution de son EDL homogène associée  $(E_0)$ .
3. Pour  $A : I \rightarrow \mathbb{R}$  une primitive de  $a$ , on a ainsi  $\mathcal{S} = \{x \mapsto f_p(x) + ke^{-A(x)}, k \in \mathbb{R}\}$ .

**Démonstration** — Sur feuille. On combine les résultats précédents (existence d'une solution particulière, linéarité, solutions de l'équation homogène associée).

Ainsi, si l'on sait trouver une solution à une EDL1  $(E)$ , on peut trouver toutes ses solutions grâce au théorème précédent.

### MÉTHODE 48 (Résolution d'une EDL1)

Soit  $(\mathcal{E}) : y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$  une EDL1, sur un intervalle  $I$ . Résolvons cette EDL.

1. On pose  $(\mathcal{E}_0) : y'(x) + a(x)y(x) = 0$  l'équation homogène associée à  $(E)$ , et on résout cette EDL.  
Pour  $A : I \rightarrow \mathbb{R}$  une primitive de  $a$ , les solutions de  $(\mathcal{E}_0)$  sont les  $x \mapsto ke^{-A(x)}$ ,  $k \in \mathbb{R}$ .
2. On trouve  $f_p : I \rightarrow \mathbb{R}$  une solution de  $(\mathcal{E})$ .  
Cette solution est appelée **solution particulière**.  
Il existe pour cela plusieurs méthodes.
  - On peut tenter de chercher une "solution évidente" (une solution qui a une expression simple). (Très rapide, pas toujours utilisable)
  - Si la fonction  $b$  a une forme précise, on peut chercher une solution particulière  $f_p$  avec une certaine forme (Rapide, pas toujours utilisable).
  - Si la fonction  $b$  s'écrit comme une somme de plusieurs fonctions plus simples, on

peut utiliser le principe de superposition pour chercher une solution particulière. (Pratique, souvent utilisable) • Ou bien, on utilise la méthode de variation de la constante. (Toujours utilisable)

3. L'ensemble des solutions de (E) s'écrit :

$$S = \{f_p + f, f \text{ solution de } (E_0)\} = \{x \mapsto f_p(x) + ke^{-A(x)}, k \in \mathbb{R}\}.$$

## 7.5 Méthode de la variation de la constante

Le dernier outil pour résoudre les EDL1 dont nous avons besoin est la méthode de variation de la constante. Son nom est un peu paradoxal, mais cette méthode permet de toujours trouver une solution particulière à une EDL1. Elle est très efficace.

### THÉORÈME 49 (Méthode de variation de la constante)

Soit  $(\mathcal{E}) : y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$  une EDL1 sur un intervalle  $I$ . Soit  $A : I \rightarrow \mathbb{R}$  une primitive de  $a$ .

- On cherche une solution particulière  $f_p$  de (E) de la forme  $f_p(x) = C(x)e^{-A(x)}$ , avec  $C : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable (qu'il faudra trouver).
- On obtient  $f_p'(x) + a(x)f_p(x) = C'(x)e^{-A(x)}$ .
- Si  $f_p$  est une solution de  $(\mathcal{E})$ , on a alors  $C'(x) = b(x)e^{A(x)}$ .
- En prenant pour  $C$  une primitive de  $x \mapsto b(x)e^{A(x)}$ , la fonction  $f_p(x) = C(x)e^{-A(x)}$  est bien une solution particulière de  $(\mathcal{E})$ .

**Démonstration** — Sur feuille.

EXEMPLE 50 — A l'aide de la méthode de variation de la constante déterminons une solution particulière de l'équation (E) :  $y'(x) + x.y(x) = x$ .

Les fonctions  $a(x) = x$  et  $b(x) = x$  sont continues sur  $\mathbb{R}$ . On va résoudre l'EDL sur  $I = \mathbb{R}$ .

- La fonction  $A : x \mapsto \frac{x^2}{2}$  est une primitive de  $a$ .
- Soit  $C : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable. On pose  $f_p : x \mapsto C(x)e^{-\frac{x^2}{2}}$ .  
On veut faire en sorte que  $f_p$  soit une solution particulière de (E).
- Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a

$$f_p'(x) + x.f_p(x) = C'(x)e^{-\frac{x^2}{2}} + C(x).(-x.e^{-\frac{x^2}{2}}) + x.C(x)e^{-\frac{x^2}{2}} = C'(x)e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

- La fonction  $f_p$  est une solution de (E) si et seulement si pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $C'(x) = b(x).e^{\frac{x^2}{2}} = x.e^{\frac{x^2}{2}}$ .

On recherche une primitive de  $x \mapsto x.e^{\frac{x^2}{2}}$ . Comme cette fonction est de la forme  $u \exp(u)$ , on lui trouve facilement une primitive.

On pose alors  $C(x) = e^{\frac{x^2}{2}}$ .

- On obtient que  $f_p : x \mapsto 1 = e^{\frac{x^2}{2}} \times e^{-\frac{x^2}{2}}$  est une solution particulière de (E).

Et, avec le théorème précédent, on obtient que les solutions de (E) sont exactement les fonctions de la forme  $x \mapsto 1 + k \exp(\frac{x^2}{2})$ , avec  $k \in \mathbb{R}$ .

REMARQUE 51 — Dans l'exemple, on pouvait déterminer  $f_p$  de façon bien plus rapide (c'était une "solution évidente"). Il y a parfois des solutions particulières très simples pour des équations différentielles, et les trouver nécessite de la pratique.

## 7.6 Les EDL1 en sciences



### Application à la SI

Les EDL d'ordre 1 représentent de nombreuses situations en sciences physiques ou industrielles.

Elles prennent en général la forme  $y'(x) + \frac{1}{\tau}y(x) = \frac{A(t)}{\tau}$ , où

- $y$  est une grandeur qui évolue au cours du temps.
- $\tau$  est une constante de la dimension du temps appelée **temps caractéristique**.
- $\frac{A}{\tau}$  modélise une action extérieure sur le système appelée en général **consigne** et est constante ou sinusoïdale. On dit que le régime est **libre** si  $A = 0$  et **forcé** sinon.

EXERCICE 9 — Soit  $v$  la vitesse d'un corps de masse  $m$  en chute libre verticale dans un champ de pesanteur d'intensité  $g$ .

Supposons que le corps est soumis à une force de frottement de l'air proportionnelle à sa vitesse  $\vec{f} = -\alpha\vec{v}$ . L'équation qui régit l'évolution de  $v$  est :

$$m \frac{dv}{dt} = -\alpha v - g$$

1. Déterminer le temps caractéristique et la consigne de cette équation.
2. Déterminer une expression de la vitesse du corps en fonction du temps.

## 7.7 Problème de Cauchy

Nous avons vu qu'une équation différentielle du premier ordre admettait toujours au moins une solution. Un **problème de Cauchy** est une équation différentielle à laquelle on ajoute des conditions initiales sur les solutions.

Cela qui arrive souvent en pratique en Physique ou Sciences de l'ingénieur (ex : définir la position initiale d'un objet, sa vitesse initiale).

Dans le cas d'un problème de Cauchy d'ordre 1, la solution est unique.

### THÉORÈME 52 (Solution au problème de Cauchy)

Soient  $I$  un intervalle et  $a, b : I \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions continues sur  $I$ . Soient  $x_0 \in I$  et  $y_0 \in \mathbb{R}$ . Alors, il existe une unique solution  $f$  au problème de Cauchy :

$$(C) : \quad y' + a(x)y = b(x) \quad \text{et} \quad f(x_0) = y_0.$$

**Démonstration** — Sur feuille.

EXERCICE 10 — Déterminer l'unique solution au problème de Cauchy suivant :

$$C : y' + 2y = 0 \quad y(1) = 4.$$

### THÉORÈME 53

Tous les résultats obtenus pour les EDL1 à coefficients réels sont valables pour les EDL1 à coefficients complexes (où on cherche  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ )

Cela termine l'étude des EDL1. Passons aux EDL2.

## 8 Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants

Les principales différences entre EDL1 et EDL2 se situent au niveau de la résolution des équations homogènes.



REMARQUE 54 — Nous allons étudier et résoudre les **EDL2 à coefficients constants**. C'est-à-dire, les EDL de la forme  $(\mathcal{E}) : y''(x) + a.y'(x) + b.y(x) = c(x)$  avec  $a, b \in \mathbb{R}$  constants et  $c : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue. Le cas des EDL2 générales n'est pas au programme de PTSI. Il sera abordé en deuxième année.

EXEMPLE 55 — L'équation  $y''(x) + y'(x) - y(x) = \tan$  est une EDL2 à coefficients constants. On peut rechercher ses solutions sur l'intervalle  $I = ] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ .

On commence par résoudre les EDL2 homogènes à coefficients constants.

## 8.1 Résolution des équations homogènes

Nous allons pour cela avoir besoin d'un outil, l'équation caractéristique.

DÉFINITION 56 (**Équation caractéristique**)

Soit  $(\mathcal{E}_0) : y''(x) + a.y'(x) + b.y(x) = 0$  une EDL2 homogène à coefficients constants. On appelle **équation caractéristique** associée à  $(\mathcal{E}_0)$  l'équation du second degré :

$$x^2 + ax + b = 0$$

L'introduction de cette équation se justifie par la proposition suivante :

PROPOSITION 57

Soit  $(\mathcal{E}_0) : y''(x) + a.y'(x) + b.y(x) = 0$  une EDL2 homogène à coefficients constants, et  $r \in \mathbb{C}$ . Alors, la fonction  $x \mapsto e^{rx}$  est solution de  $(\mathcal{E}_0)$  si et seulement si  $r$  est solution de l'équation caractéristique  $x^2 + ax + b = 0$ .

**Démonstration** — Sur feuille. On utilise les dérivées de  $x \mapsto e^{rx}$ .

On commence par résoudre les EDL2 homogènes à coefficients complexes, car les solutions s'écrivent beaucoup plus simplement. On résoudra ensuite les EDL2 homogènes à coefficients réels.

PROPOSITION 58 (EDL2 homogènes à coefficients complexes)

Soit  $(\mathcal{E}_0) : y''(x) + a.y'(x) + b.y(x) = 0$  une EDL2 homogène, à coefficients constants, qui sont complexes ( $a, b \in \mathbb{C}$ ).

Soit  $x^2 + ax + b = 0$  son équation caractéristique.

1. Si son équation caractéristique a deux racines distinctes  $r_1, r_2 \in \mathbb{C}$ , alors les solutions de  $(\mathcal{E}_0)$  sont toutes les fonctions de la forme :

$$x \mapsto \lambda_1.e^{r_1x} + \lambda_2.e^{r_2x}, \text{ avec } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}.$$

2. Si son équation caractéristique a une racine double  $r_0 \in \mathbb{C}$ , alors les solutions de  $(\mathcal{E}_0)$  sont toutes les fonctions de la forme :

$$x \mapsto e^{r_0x}(\lambda_1 + \lambda_2.x), \text{ avec } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}.$$

**Démonstration** — Sur feuille.

EXEMPLE 59 — L'équation  $(E) : y''(x) + y(x) = 0$  est une EDL2 homogène à coeffs constants. Résolvons-la dans  $\mathbb{C}$ . Son équation caractéristique associée est  $x^2 + 1 = 0$ , qui a pour racines  $i$  et  $-i$ .

Donc, l'ensemble des solutions de  $(E)$  est  $S = \{x \mapsto \lambda_1 e^{ix} + \lambda_2 e^{-ix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}\}$ . On a exprimé les solutions valeurs dans  $\mathbb{C}$  de cette EDL. Ses solutions dans  $\mathbb{R}$  s'écrivent différemment.

Traitons maintenant le cas des solutions à valeurs réelles, qui s'exprime un peu moins simplement que dans  $\mathbb{C}$ .

## PROPOSITION 60

Soit  $(\mathcal{E}_0) : y''(x) + a.y'(x) + b.y(x) = 0$  une EDL2 homogène à coefficients constants, avec  $a, b \in \mathbb{R}$ .

Soit  $x^2 + ax + b = 0$  son équation caractéristique.

1. Si son équation caractéristique a deux racines réelles distinctes  $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ , alors les solutions de  $(\mathcal{E}_0)$  sont toutes les fonctions de la forme :

$$x \mapsto \lambda_1.e^{r_1x} + \lambda_2.e^{r_2x}, \text{ avec } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

2. Si son équation caractéristique a une racine double  $r_0 \in \mathbb{R}$ , alors les solutions de  $(\mathcal{E}_0)$  sont toutes les fonctions de la forme :

$$x \mapsto e^{r_0x}(\lambda_1 + \lambda_2.x), \text{ avec } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

3. Si son équation caractéristique a deux racines complexes conjuguées  $r_1 = a+ib, r_2 = a-ib$ , alors l'ensemble des solutions de  $(\mathcal{E}_0)$  est l'ensemble des fonctions de la forme :

$$x \mapsto e^{ax}(\lambda_1 \cos(bx) + \lambda_2 \sin(bx)), \text{ avec } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

**Démonstration** — Sur feuille.

## EXERCICE 11 — Résoudre les équations différentielles homogènes suivantes :

$$\begin{array}{l|l} 1. y''(x) + 4y'(x) - 5y(x) = 0 & 3. y''(x) + 2y'(x) + 2y(x) = 0 \\ 2. y''(x) - 2y'(x) + y(x) = 0 & \end{array}$$

## 8.2 Solution particulière

On résoud les EDL2 avec la même idée que les EDL1 : On trouve les solutions de l'EDL homogène associée, et on trouve une solution particulière.

Mais, trouver une solution particulière d'une EDL2 n'est pas aussi simple que pour les EDL1. Il existe une méthode de la variation de la constante pour les EDL2, mais elle est plus compliquée et n'est pas au programme.

Dans ce chapitre, on se restreint donc à déterminer des solutions particulières d'EDL2 quand le second membre  $c : x \mapsto c(x)$  est de la forme :

- $x \mapsto Ae^{\lambda x}$ , avec  $A, \lambda \in \mathbb{C}$  des complexes.
- $x \mapsto B \cos(\omega x)$  ou  $x \mapsto B \sin(\omega x)$ , avec  $B, \omega \in \mathbb{R}$  des réels.

MÉTHODE 61 (Recherche d'une solution particulière pour certaines EDL2)

Soit  $(E)$  une EDL d'ordre 2 de la forme  $y''(x) + ay'(x) + by(x) = Ae^{\lambda x}$ , avec  $A, \lambda \in \mathbb{C}$  des complexes.

Pour déterminer une solution particulière  $f$  de cette équation, on distingue 3 cas.

1. Si  $\lambda$  n'est pas solution de l'équation caractéristique  $x^2 + ax + b = 0$ , on cherche  $f$  de la forme  $f : x \mapsto \alpha.e^{\lambda x}$ .  
On détermine la valeur de  $\alpha \in \mathbb{C}$  en remplaçant cette expression dans l'équation  $(E)$ .
2. Si  $\lambda$  est une racine simple de l'équation caractéristique  $x^2 + ax + b = 0$ , on cherche  $f$  de la forme  $f : x \mapsto \alpha.xe^{\lambda x}$ .  
On détermine la valeur de  $\alpha \in \mathbb{C}$  en remplaçant  $f$  dans l'équation  $(E)$ .
3. Si  $\lambda$  est une racine double de l'équation caractéristique  $x^2 + ax + b = 0$ , on cherche  $f$  de la forme  $f : x \mapsto \alpha.x^2e^{\lambda x}$ .  
On détermine la valeur de  $\alpha \in \mathbb{C}$  en remplaçant  $f$  dans l'équation  $(E)$ .

**Démonstration** — *Sur feuille.*

**MÉTHODE 62** (Recherche d'une solution particulière pour certaines EDL2)

Soit  $(E)$  une EDL d'ordre 2 de la forme  $(E) : y''(x) + ay'(x) + by(x) = B \cos(\omega x)$  ou  $y''(x) + ay'(x) + by(x) = B \sin(\omega x)$ , avec  $B, \omega \in \mathbb{R}$  des réels.

Pour déterminer une solution particulière  $f$  de cette équation :

1. On détermine une solution particulière  $f_p$  de l'EDL à coeffs complexes  $y''(x) + ay'(x) + by(x) = Be^{i\omega x}$ .
2. La fonction  $f : x \mapsto \operatorname{Re}(f_p(x))$  est une solution particulière de  $(E) : y''(x) + ay'(x) + by(x) = B \cos(\omega x)$ .
3. La fonction  $f : x \mapsto \operatorname{Im}(f_p(x))$  est une solution particulière de  $(E) : y''(x) + ay'(x) + by(x) = B \sin(\omega x)$ .

**EXERCICE 12** — *Déterminer une solution particulière aux équations différentielles :*

$$\begin{array}{l|l} 1. y'' - 3y' + 2y = 3e^x & 3. y'' - 3y' + 2y = \cos(x) \\ 2. y'' - 3y' + 2y = -5e^{-x} & \end{array}$$

Le principe de superposition est aussi valable pour les EDL2, ce qui permet de trouver une solution particulière (et de résoudre) à davantage d'EDL2.

**THÉORÈME 63 (Principe de superposition)**

Soit  $I$  un intervalle. Soient  $a, b \in \mathbb{C}$ , et  $c_1, c_2 : I \rightarrow \mathbb{C}$  des fonctions continues. Soit  $k \in \mathbb{C}$ .

Soient  $f_1, f_2$  des solutions particulières aux EDL2  $(\mathcal{E}_\infty) : y''(x) + a.y'(x) + b.y(x) = c_1(x)$ ,  $(\mathcal{E}_\epsilon) : y''(x) + a.y'(x) + b.y(x) = c_2(x)$  une EDL2.

Alors, la fonction  $f = f_1 + k.f_2$  est une solution particulière de l'équation  $(\mathcal{E}) : y''(x) + a.y'(x) + b.y(x) = c_1(x) + k.c_2(x)$ .

**Démonstration** — *Sur feuille. Il faut vérifier les calculs.*

**EXERCICE 13** — *Déterminer une solution particulière de l'équation différentielle  $(E) : y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = 3e^x - 5e^{-x} + \cos(x)$ .*

### 8.3 Résolution générale

Pour résoudre une EDL2, le résultat général reste identique à celui des EDL1.

**THÉORÈME 64 (Existence de solutions)**

Soit  $(\mathcal{E}) : y'' + a.y' + by = c(x)$  une EDL d'ordre 2 à coefficients constants.

Alors l'équation  $(E)$  admet des solutions.

**Démonstration** — *(Hors programme).*

**THÉORÈME 65** (Solutions d'une EDL2 à coeffs constants)

Soit  $(\mathcal{E}) : y'' + a.y' + b.y = c(x)$  une EDL2 à coeffs constants.

Soit  $f_p$  une solution particulière de  $(\mathcal{E})$ . Soit  $\mathcal{S}_0$  des solutions de l'équation homogène associée  $y'' + a.y' + b.y = 0$ .

Alors, l'ensemble des solutions de  $(E)$  noté  $\mathcal{S}$  est :

$$\mathcal{S} = \{f_p + f, \text{ avec } f \in \mathcal{S}_0\}.$$

**Démonstration** — *Sur feuille. On utilise les résultats précédents (existence d'une solution particulière, linéarité, solutions de l'équation homogène associée).*

On peut donc donner une méthode générale de résolution d'une EDL d'ordre 2 à coefficients constants.

**MÉTHODE 66** (Résoudre une EDL2 à coeffs constants)

Soit  $(\mathcal{E}) : y'' + a.y' + by = c(x)$  une EDL d'ordre 2 à coefficients constants. Pour déterminer l'ensemble des solutions de  $(E)$ .

1. On résout l'équation homogène associée  $(\mathcal{E}_0) \quad y'' + a.y' + by = 0$  associée à  $(\mathcal{E})$ .  
Cela utilise l'équation caractéristique  $x^2 + ax + b = 0$ .
2. On détermine une solution particulière  $f_p$  de  $(\mathcal{E})$ .  
Soit, on trouve une "solution évidente". (Utilisable parfois)  
Si la fonction  $c$  s'écrit comme une somme de fonction plus simples, on utilise le principe de superposition. (Utilisable parfois)  
Si  $c(x) = Ae^{\lambda x}$  ou  $B \cos(\omega.x)$  ou  $B \sin(\omega.x)$ , on trouve une solution particulière avec les méthodes spécifiques pour ces fonctions.
3. Soit  $\mathcal{S}_0$  l'ensemble des solutions de  $(E_0)$ .  
Alors, l'ensemble des solution de  $(\mathcal{E})$  est

$$S = \{f_p + f, \text{ avec } f \in \mathcal{S}_0\}.$$



### Application à la Physique

On rencontre également beaucoup d'EDL d'ordre 2 à coefficients constants en Physique et S.I..

Leur forme générale est  $y''(t) + 2\lambda y'(t) + \omega_0^2 y(t) = f(t)$ , avec :

- $y$  est une grandeur évoluant au cours du temps.
- $\lambda \geq 0$  modélise les phénomènes qui dissipent de l'énergie, on l'appelle le **coefficient d'amortissement**.
- la constante  $\omega_0 > 0$  est la **pulsation propre**.
- le second membre  $f$  représente l'action extérieure sur le système.

**EXERCICE 14** — On considère un circuit RLC en série. L'équation d'évolution de la charge  $q$  du condensateur est :

$$U = \frac{q}{C} + R \frac{dq}{dt} + L \frac{d^2q}{dt^2}$$

1. Déterminer le coefficient d'amortissement du système ainsi que sa pulsation propre.
2. Donner l'expression de la charge  $q$  en fonction du temps (Résoudre l'équation différentielle).

## 8.4 Problème de Cauchy

On termine cette étude des EDL2 par le cas des problèmes de Cauchy (une EDL2 avec des conditions initiales). Pour une EDL1, on avait une condition initiale ( $f(x_0) = y_0$ ). Pour une EDL2, on a deux conditions initiales ( $f(x_0) = y_0$  et  $f'(x_0) = y_1$ ).

**THÉORÈME 67 (Problème de Cauchy)**

Soit  $(\mathcal{E}) : y''(x) + a.y'(x) + by(x) = c(x)$  une EDL2 à coefficients constants sur un intervalle  $I$ . Soient  $x_0 \in I$  et  $y_0, y_1 \in \mathbb{C}$  deux constantes.

Alors, il existe une unique solution  $f$  de l'équation  $(E)$  telle que  $f(x_0) = y_0$  et  $f'(x_0) = y_1$ .

**Démonstration** —

EXERCICE 15 — Déterminer l'unique solution  $f$  de l'équation différentielle  $y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = 3e^x - 5e^{-x} + \cos(x)$ , telle que  $f(0) = 0$  et  $f'(0) = 1$ .

**Bilan du contenu nécessaire à maîtriser :**

- Notion de primitive  $F$  d'une fonction  $f$ . Toutes les primitive de  $F$  sont égales à une constante près.
- Primitives des fonctions usuelles  $x^n, x^a, \frac{1}{x}, \exp, \ln, \cos, \sin, \text{ch}, \text{sh}$ .  
Dérivée de  $\tan, \arccos, \arcsin, \arctan$ .
- Primitives des fonctions  $\frac{1}{ax^2+bx+c}$  selon le signe du discriminant. Cas  $\frac{1}{a(x-r_1)(x-r_2)}$ , cas  $\frac{1}{(cx+d)^2}$ , cas  $\frac{1}{\lambda((cx+d)^2+1)}$ .
- Déterminer des primitives à l'aide de  $(\ln(|u|))' = \frac{u'}{u}$ ,  $(u^2)' = 2u'u$ ,  $(u^n)' = nu'u^{n-1}$ ,  $(u^a)' = au'u^{a-1}$ ,  $(e^u)' = u'e^u$ .
- Théorème : Toutes les fonctions continues sur un intervalle ont une primitive. On l'écrit  $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ .
- Théorème de Newton-Leibniz :  $\int_a^b f(t)dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a)$ . Utilisation pour calculer des intégrales.
- Méthode d'intégration par parties (IPP) :  $\int u'v = [uv] - \int uv'$ , pour déterminer des primitives et des intégrales.
- Méthode du changement de variables :  $t = f(u), dt = f'(u)du$ , pour déterminer des primitives et des intégrales.
- Définition des EDL1 et EDL2.
- EDL1 : Forme de l'ensemble des solutions. Résolution des EDL1 homogènes  $y' + a(x)y = 0$ . Méthode de variation de la constante pour trouver une solution particulière. Savoir résoudre un problème de Cauchy.  
Savoir tester des fonctions "simples" pour trouver une solution évidente.
- EDL2 à coeffs constants : Forme de l'ensemble des solutions. Polynôme associée  $x^2 + ax + b = 0$ . Résolution des EDL2 homogènes  $y'' + ay' + by = 0$ , en fonction des racines du polynôme associé. Savoir résoudre un problème de Cauchy.  
Savoir tester des fonctions "simples" pour trouver une solution particulière évidente.