

FEUILLE DE TD N° 11

Polynômes

Exercice 1.

Développer les sommes et produits suivants :

1. $(X^3 - X^2 + X - 1).(X^2 + 1)$
2. $(X - 1)(X - 2)(X + 3)$
3. $(2 + X)(2 + X)(2 + X)(2 + X)$
4. $X(X - 1)(X - 2) - (X - 1)(X - 2)(X - 3)$
5. $(X - (1 + i))^2(X - (1 - i))^2$
6. $1 + X.(2 + X.(3 + X.(4 + X.(5 + X))))$
7. $(X - 1)^n - (X + 1)^n$, pour $n \geq 0$

Exercice 2.

Effectuer les divisions euclidiennes suivantes :

1. $X^3 - X^2 + X - 1$ par $X + 1$
2. $X^4 - 3X^3 + 2$ par $X^2 + 2$
3. $3X^5 + 2X^2 + X - 4$ par $X^2 + X + 1$
4. $X^n - 1$ par $X - 1$, pour $n \geq 1$

Exercice 3.

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$.

Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)$ (degré, coefficients).

A l'aide de ces informations, montrer que l'on a $(X - a) \mid P(X)$ si et seulement si $P(a) = 0$.

Exercice 4.

Soient $a, b \in \mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}[X]$.

Montrer que l'on a $(X - a)(X - b) \mid P$ si et seulement si $P(a) = P(b) = 0$.

On pourra s'aider de l'exercice précédent.

Exercice 5.

• Résoudre dans $\mathbb{K}[X]$ l'équation : $P(X^2) = (X^2 + 1)P(X)$.

On posera $n = \deg(P)$, et on calculera $\deg(P(X^2))$.

Puis on regardera les coefficients de P pour obtenir un système linéaire à résoudre.

• Résoudre dans $\mathbb{C}[X]$ l'équation : $P(X^2) = P(X)^2$.

On montrera, en utilisant le cours sur les racines, que si P possède une racine λ alors on doit avoir $\lambda = 0$.

Exercice 6.

1. Donner un polynôme $R \in \mathbb{R}_2[X]$ tel que $R(1) = 0$ et $R(2) = 0$.

2. Soit $P \in \mathbb{R}_3[X]$. Donner l'écriture de P .

3. On suppose que $P(1) = 0$ et $P(2) = 1$.

Trouver toutes les valeurs de P possibles.

4. Montrer que le polynôme P est de la forme $P(X) = (X - 1) + (X - 1)(X - 2)Q(X)$, avec $Q \in \mathbb{R}[X]$.

Exercice 7 (Coefficients-racines).

1. Soient $a, b \in \mathbb{C}$ tels que $a + b = 2$ et $a^2 + b^2 = 1$.

Sans calculer les valeurs de a et b , déterminer ab .

2. Soient $c, d \in \mathbb{C}$ tels que $c + d = 5$ et $cd = 1$.

Sans calculer les valeurs de a et b , déterminer $c^3 + d^3$.

Exercice 8. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré 3. On suppose que P n'a pas de racines dans \mathbb{K} .

Montrer alors que P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Exercice 9.

Factoriser les polynômes suivants.

S'ils ont des racines, lister leurs racines.

Dire si le polynôme est irréductible, scindé, à racines simples.

1. $3X^2 + 2$ dans $\mathbb{R}[X]$

2. $X^2 - 3X + 1$ dans $\mathbb{R}[X]$
3. $X^3 - 3X^2 - X + 3$ dans $\mathbb{R}[X]$
4. $X^3 - 1$ dans $\mathbb{R}[X]$ et dans $\mathbb{C}[X]$.
Pour $\mathbb{C}[X]$ on utilisera le cours sur les nombres complexes.
5. $X^4 + 1$ dans $\mathbb{R}[X]$ et dans $\mathbb{C}[X]$.
Pour $\mathbb{R}[X]$, on pourra utiliser $2X^2$ pour faire apparaître un carré.
Pour $\mathbb{C}[X]$ on pourra utiliser (-1) pour faire apparaître un carré.
6. $X^n - z^n$ dans $\mathbb{C}[X]$, pour $z \neq 0$ et $n \geq 1$.

Exercice 10.

Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P(2) = 6$, $P'(2) = 1$, $P''(2) = 4$, et $P^{(k)}(2) = 0$ pour tout $k \geq 3$.

Exercice 11 ((Interpolation)).

1. Trouver un polynôme $P_1 \in \mathbb{R}_3[X]$ tel que $P_1(0) = 0$, $P_1(1) = 0$, $P_1(2) = 1$.
2. Trouver un polynôme $P_2 \in \mathbb{R}_3[X]$ tel que $P_2(0) = 0$, $P_2(1) = 1$, $P_2(2) = 0$.
3. Trouver un polynôme $P_3 \in \mathbb{R}_3[X]$ tel que $P_3(0) = 1$, $P_3(1) = 0$, $P_3(2) = 0$.
4. Trouver un polynôme $Q \in \mathbb{R}_3[X]$ tel que $Q(0) = 10$, $Q(1) = 9$, $Q(2) = 8$.

Exercice 12. Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ le polynôme $X^2 - 2X \cos(n\theta) + 1$.

Écrire la relation obtenue pour $X = 1$.

Exercice 13. (Développement)] Soit $n \geq 1$.

Développer le polynôme : $P(X) = (1 + X)(1 + X^2)(1 + X^4) \dots (1 + X^{2^{n-1}})$.

Exercice 14.

Rappeler le résultat de cours pour déterminer la multiplicité d'une racine α .
Le polynôme $X^n - 4$ a-t-il des racines multiples? On ne demande pas de déterminer les racines, juste de calculer la multiplicité d'une racine α .
Montrer que les racines de $X^n + X - 1$ sont de multiplicité 1.
Le polynôme $P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} X^k$ a-t-il des racines multiples?

Exercice 15.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 2$.

En utilisant une formule de Taylor, déterminer la division euclidienne de P par $(X - 2)^2$.

A quelle condition le reste de cette division euclidienne est-il nul?

Exercice 16. Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que P' divise P .
On pourra utiliser une factorisation de P .

Exercice 17.

Soit $n \geq 0$. Est-ce que le polynôme $X^2 + X + 1$ divise $X^{3n+8} + X^{3n+4} + X^{3n}$?

Exercice 18 (Polynômes d'Euler).

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique polynôme $E_n \in \mathbb{K}[X]$ tel que :

$$E_n(X) + E_n(X + 1) = 2X^n$$

2. Trouver une relation entre E'_n et E_n pour tout $n \geq 1$.
3. Pour $h \in \mathbb{R}$, trouver une expression du type :

$$E_n(X + h) = \sum_{p \geq 0} a_p E_p$$

En déduire une relation de récurrence sur les polynômes E_n .

4. Calculer E_n pour $0 \leq n \leq 4$.